

УЛОГАТА НА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНАТА ОСТЕОРОЗА-ОСТЕОАРТРИТ ВО ХРОНИЧНАТА ЛИЦЕВОВИЛИЧНА БОЛКА

Проф.Д-р.А.Грчев, Д-р.С.Божовик,
Д-р.А.Илиев

Стоматолошки факултет-Скопје
Клиника за максилофацијална
хирургија



МИОФАЦИЈАЛЕН БОЛЕН ДИСФУНКЦИОНАЛЕН СИНДРОМ -М.Б.Д.С.-

(*myofacial pain dysfunctional Sy.M.P.Sy.*)

- БОЛКА (*n.auriculotemporalis, n.trigeminus*)
- ХИПОМОБИЛНОСТ (*Отежнато отварање*)
- ЗГЛОБНИ ЗВУЦИ (*Тропкање*)
- КРЕПИТАЦИИ
- ГЛАВОБОЛКА
- ТИНИТУС
- ВЕРТИГО





МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ: РТГ наоди



ДИСТРИБУЦИЈА ПО ПОЛ И ВОЗРАСТ

	20-30		31-40		41-50		> 50		ВКУПНО:	
	бр.	%								
ЖЕНСКИ ПОЛ	16	88,89	22	75,86	28	82,35	9	75,00	75	80,65
МАШКИ ПОЛ	2	11,11	7	24,14	6	17,65	3	25,00	18	19,35
ВКУПНО:	18	19,35	29	31,18	34	36,56	12	12,90	93	100,00

СТ



ПОЛ И ВОЗРАСТ

